

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	レーバンH 注入軟膏 EX																		
2	成分・分量	[1 個(2.0g)中] プレドニゾン酢酸エステル … 1mg、リドカイン … 60mg、 クロルフェニラミンマレイン酸塩 … 4mg、アラントイン … 20mg、 イソプロピルメチルフェノール … 2mg、トコフェノール酢酸エステル … 50mg																		
3	用法・用量	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>用法</th> <th>1 回量</th> <th>1 日使用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">成人 (15 歳以上)</td> <td>注入</td> <td>1 個</td> <td>1～2 回</td> </tr> <tr> <td>塗布</td> <td>適量</td> <td>1～3 回</td> </tr> <tr> <td>15 歳未満</td> <td colspan="3">使用しないこと</td> </tr> </tbody> </table> <p>【注入する場合】ノズル部分を肛門内に挿入し、全量をゆっくり注入してください。 【塗布する場合】肛門部に塗布してください。なお、一度塗布に使用したものは、注入に使用しないでください。</p>				年齢	用法	1 回量	1 日使用回数	成人 (15 歳以上)	注入	1 個	1～2 回	塗布	適量	1～3 回	15 歳未満	使用しないこと		
年齢	用法	1 回量	1 日使用回数																	
成人 (15 歳以上)	注入	1 個	1～2 回																	
	塗布	適量	1～3 回																	
15 歳未満	使用しないこと																			
4	効能・効果	きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和																		
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください。 (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)患部が化膿している人。</p> <p>2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。 抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)</p> <p>3. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。 (眠気等があらわれることがあります。)</p> <p>4. 長期連用しないでください。</p> <p>次に該当する人はお申し出ください。 (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (4)次の症状のある人。 排尿困難 (5)次の診断を受けた人。 緑内障</p>																		
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項																			

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。