

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	六君子湯(りっくんしょう)																
2	成分・分量	<p>本品 1 包(1 日量)21.5g 中</p> <table border="0"> <tr> <td>日本薬局方 ニンジン</td> <td>4.0g</td> <td>日本薬局方 タイソウ</td> <td>2.0g</td> </tr> <tr> <td>日本薬局方 ビャクジュツ</td> <td>4.0g</td> <td>日本薬局方 カンゾウ</td> <td>1.0g</td> </tr> <tr> <td>日本薬局方 ブクリョウ</td> <td>4.0g</td> <td>日本薬局方 ショウキョウ</td> <td>0.5g</td> </tr> <tr> <td>日本薬局方 ハンゲ</td> <td>4.0g</td> <td>日本薬局方 チンピ</td> <td>2.0g</td> </tr> </table>	日本薬局方 ニンジン	4.0g	日本薬局方 タイソウ	2.0g	日本薬局方 ビャクジュツ	4.0g	日本薬局方 カンゾウ	1.0g	日本薬局方 ブクリョウ	4.0g	日本薬局方 ショウキョウ	0.5g	日本薬局方 ハンゲ	4.0g	日本薬局方 チンピ	2.0g
日本薬局方 ニンジン	4.0g	日本薬局方 タイソウ	2.0g															
日本薬局方 ビャクジュツ	4.0g	日本薬局方 カンゾウ	1.0g															
日本薬局方 ブクリョウ	4.0g	日本薬局方 ショウキョウ	0.5g															
日本薬局方 ハンゲ	4.0g	日本薬局方 チンピ	2.0g															
3	用法・用量	<p>大人(15 才以上)は 1 包(1 日量)につき水 400mL を加え、あまり強くない火にかけ 200mL に煮つめ、紙袋とともに煎じかすを取り去り、食前 1 時間前又は食間空腹時に温服してください。小人(15 才未満 2 才以上)は同様に煎じて食間空腹時に温服してください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>1 包(1 日量)煎じ液</th> <th>1 日服用量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大人(15 才以上)</td> <td>全量</td> <td>3~2 回に分けて</td> </tr> <tr> <td>15 才未満 7 才以上</td> <td>2/3 量</td> <td rowspan="3">3 回に分けて</td> </tr> <tr> <td>7 才未満 4 才以上</td> <td>1/2 量</td> </tr> <tr> <td>4 才未満 2 才以上</td> <td>1/3 量</td> </tr> <tr> <td>2 才未満</td> <td colspan="2">服用しないこと</td> </tr> </tbody> </table>	年齢	1 包(1 日量)煎じ液	1 日服用量	大人(15 才以上)	全量	3~2 回に分けて	15 才未満 7 才以上	2/3 量	3 回に分けて	7 才未満 4 才以上	1/2 量	4 才未満 2 才以上	1/3 量	2 才未満	服用しないこと	
年齢	1 包(1 日量)煎じ液	1 日服用量																
大人(15 才以上)	全量	3~2 回に分けて																
15 才未満 7 才以上	2/3 量	3 回に分けて																
7 才未満 4 才以上	1/2 量																	
4 才未満 2 才以上	1/3 量																	
2 才未満	服用しないこと																	
4	効能・効果	胃腸の弱いもので、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：胃炎、胃アトニー、胃下垂、消化不良、胃痛、嘔吐																
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>次に該当する人はお申し出ください。</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人                  (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人                  (3) 高齢者                  (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人                  (5) 次の症状のある人：むくみ                  (6) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病</p>																
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項																	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。