

第2類医薬品
鎮痒消炎薬

しっしん・皮膚炎・かゆみ

デルマパール軟膏

◆デルマパール軟膏の特長

- * 主成分のヒドロコルチゾン酪酸エステルは優れた抗炎症作用があります。
- * 日常よく発生する、しっしん、皮膚炎、かぶれなどのいろいろな症状に、優れた効果を発揮します。
- * のびのよいゲル状の基剤ですので、患部がカサカサ・ジुकジुकしているときにもソフトな使用感の軟膏です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください。
水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
2. 顔面には広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。

👤 相談すること

1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|--------|-------------------------------|
| 皮ふ | 発疹・発赤、かゆみ |
| 皮ふ（患部） | みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感 |

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

成分・分量（100g中）

ヒドロコルチゾン酪酸エステル……………0.05g
添加物（基剤）としてゲル化炭化水素を含有します。

（裏面につづく）

効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

用法・用量

1日数回、患部に適量を塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。
- 外用のみに使用してください。

ポイント！

- *患部がカサカサしている時は、指先で強くこすらないようによくすり込んでください。
- *患部がジクジクしている時は厚目に塗ってください。

保管・取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5)開封時に、基剤の一部が液状となってわずかに流れ出ることがありますが、品質の劣化ではありませんので、そのままご使用ください。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

発 売 元 **日邦薬品工業株式会社** 東京都渋谷区代々木3-46-16

販 売 元 **コーアバイオテックベイ株式会社** 神奈川県横浜市港北区日吉7-15-13

製造販売元 **株式会社 廣 昌 堂** 富山県射水市水戸田2841

(お客様相談窓口)0766-54-1007
(受付時間)9:00～17:00(土日祝日を除く)