

この添付文書は、服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保存しておいてください。

第②類医薬品

ビタミンAD配合保健剤

ポリグロン

ポリグロンはビタミンA、ビタミンD₂を主成分として、南方産の蛇油を処方したソフトカプセルの保健剤です。さらに、服用感をよくするために銅クロロフィルを配合してあります。

ビタミンAが不足すると、暗順応の減退により視力が弱まり夜盲症にかかりやすくなるだけでなく、皮膚や粘膜の上皮細胞の乾燥、角化がおこり、目では眼球の乾燥などをおこやすくなります。

ビタミンAは夜盲症を予防し、粘膜の上皮細胞の乾燥による目の乾燥感を緩和します。

ビタミンDが不足するとカルシウムとリン酸のバランスがくずれ、骨塩の沈着・骨の石灰化の阻害、骨組織からのカルシウムの遊離を生じて、小児ではくる病にかかりやすくなったり、成人では骨軟化症や骨多孔症の原因になります。

エルゴカルシフェロール(ビタミンD₂)は体内で活性型となり、カルシウムとリン酸の腸内吸収を促進させ、また、その血中濃度を正常に保つことにより、骨組織での骨の形成を促進して骨や歯を丈夫にします。

このようにポリグロンは発育ざかりのお子様から働き盛りの壮年、および老年期の方まで広くご愛用いただける保健剤です。

⚠️ [使用上の注意]



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊娠3ヵ月以内の妊婦、妊娠していると思われる人又は妊娠を希望する人。

(妊娠3ヵ月前から妊娠3ヵ月までの間にビタミンAを1日10,000国際単位以上摂取した妊婦から生まれた児に先天異常の割合が上昇したとの報告がある。)

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

[効能・効果]

- 次の症状の緩和：目の乾燥感
- 骨歯の発育不良
- 夜盲症(とり目)
- くる病の予防
- 次の場合のビタミンADの補給：妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、発育期、老年期

(裏面につづく)

〔用法・用量〕

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	2 カプセル	1 回
7歳以上15歳未満	1 カプセル	
7歳未満	服用しないこと。	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法、用量を守ってください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〔成分・分量〕（2カプセル中）

ビタミンA油	4000I.U.
エルゴカルシフェロール（ビタミンD）	400I.U.

添加物として蛇油、銅クロロフィル、香料、カプセルにゼラチン、グリセリン、白糖、エチルパラベン、赤色102号、青色1号を含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 吸湿性のため湿気にご注意ください。ピンは密栓してください。
- (5) ピン開け口の詰め物は輸送中のカプセル破損防止用です。開栓後は不要となりますので捨ててください。
- (6) 外箱及びラベルに表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

〔包 装〕

80カプセル 160カプセル 300カプセル

〔お問い合わせ先〕

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室
電 話：03 (3370) 7174 (代表)
受付時間：9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

発 売 元 **日邦薬品工業株式会社**
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元 **コーア製薬株式会社**
横浜市港北区箕輪町2-17-5