

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

指定第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	アスゲン AD								
2	成分・分量	[2 カプセル中] ビタミン A 油 … 4mg(ビタミン A として 4,000 国際単位) コレカルシフェロール … 10 $\mu$ g(ビタミン D <sub>3</sub> として 400 国際単位) 乳酸カルシウム水和物 … 340mg 酢酸 d- $\alpha$ -トコフェロール(ビタミン E) … 14mg								
3	用法・用量	次の 1 回服用量を 1 日 1 回、なるべく空腹時をさけて、水又は白湯で服用してください。 <table border="1"><thead><tr><th>年齢</th><th>1 回服用量</th></tr></thead><tbody><tr><td>成人(15 歳以上)</td><td>1 回 2 カプセル</td></tr><tr><td>5 歳以上 15 歳未満</td><td>1 回 1 カプセル</td></tr><tr><td>5 歳未満</td><td>服用しないでください</td></tr></tbody></table>	年齢	1 回服用量	成人(15 歳以上)	1 回 2 カプセル	5 歳以上 15 歳未満	1 回 1 カプセル	5 歳未満	服用しないでください
年齢	1 回服用量									
成人(15 歳以上)	1 回 2 カプセル									
5 歳以上 15 歳未満	1 回 1 カプセル									
5 歳未満	服用しないでください									
4	効能・効果	○ 次の症状の緩和: 目の乾燥 ○ 骨歯の発育不良 ○ 夜盲症(とり目、暗所での見えにくさ) ○ くる病の予防 ○ 次の場合のビタミン AD の補給: 妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、発育期、老年期								
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次に該当する人はお申し出ください。 (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊娠 3 カ月以内の妊婦、妊娠していると思われる人又は妊娠を希望する人。 (妊娠 3 カ月前から妊娠 3 カ月までの間にビタミン A を 1 日 10,000 国際単位以上摂取した妊婦から生まれた児に先天異常の割合が上昇したとの報告がある。)								
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項									

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。