

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	アレギトール
2	成分・分量	成人1日量(6錠)中 グリチルリチン酸カリウム 180mg / リン酸ピリドキサル 12mg / クロルフェニラミンマレイン酸塩 9mg
3	用法・用量	次の1回量を1日2回食後に服用してください 成人(15才以上):1回3錠 / 11才以上15才未満:1回2錠 / 5才以上11才未満:1回1錠 / 5才未満:服用しないこと
4	効能・効果	じんましん、しっしん(湿疹)、かゆみ、かぶれ、鼻炎
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。 他のアレルギー用薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻 炎用内服薬、乗物酔い薬等) 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気があらわれること がある) 3. 長期連用しないでください。 次に該当する人はお申し出ください。 (1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)高齢者 (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5)次の症状のある人:むくみ、排尿困難 (6)次の診断を受けた人:心臓病、高血圧、腎臓病、緑内障
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。