

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第三類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 名称 | エマフラシン シロップ |
| 2 | 成分・分量 | 1 日量(10mL) 中 リボフラビンリン酸エステルナトリウム (ビタミン B2) 20mg ピリドキシン塩酸塩 (ビタミン B6) 50mg パントテン酸カルシウム 25mg ニコチン酸アミド 50mg ヨクイニンエキス (ヨクイニン流エキス) 1mL (ヨクイニンとして 1,000mg) |
| 3 | 用法・用量 | 大人(15 才以上) 1 回 10mL、 11 才以上 15 才未満 1 回 8mL 7 才以上 11 才未満 1 回 6mL、 3 才以上 7 才未満 1 回 4mL 1 才以上 3 才未満 1 回 3mL、 6 カ月以上 1 才未満 1 回 2mL 1 日 1 回服用してください 6 カ月未満 服用しないこと ※添付の計量コップをご使用下さい。 |
| 4 | 効能・効果 | ○次の諸症状の緩和: 口内炎、皮膚炎、舌炎、口角炎、口唇炎、湿疹、かぶれ、 ただれ、にきび、肌あれ 「ただし、これらの症状について、1 カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、 医師又は薬剤師に相談して下さい。」 ○次の場合のビタミン B2B6 の補給: 肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時 |
| 5 | 保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項 | |
| 6 | 薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項 | |

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。