

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	シロップ A アスゲン a
2	成分・分量	[60mL(成人 1 日服用量)中] マオウエキス 510mg、カンゾウエキス 250mg、シヨウキョウ流エキス 1mL、ケイヒ流エキス 1mL、サイシン流エキス 1mL、ゴミシ流エキス 1mL、ハンゲエキス 80mg、ノスカピン塩酸塩水和物 38mg、グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 8.2mg、無水カフェイン 72mg
3	用法・用量	下記 1 回量を 1 日 4 回、毎食後及び就寝前に服用してください。 成人(15 歳以上):10mL、11 歳以上 15 歳未満:7mL、 8 歳以上 11 歳未満:5mL、5 歳以上 8 歳未満:3mL、1 歳以上 5 歳未満:2mL、 3 ヶ月以上 1 歳未満:1mL、3 ヶ月未満:服用しないこと やむをえない場合は、上記用量を 4 時間ごとに 1 日 6 回まで服用できます。使用に際しては、よく振ってから服用してください。
4	効能・効果	せき、喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅー)をともなうせき、たん
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。 (眠気等があらわれることがあります。) 3. 長期連用しないでください。 次に該当する人はお申し出ください。 ・医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・高齢者 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・次の症状のある人: 高熱、むくみ、排尿困難 ・次の診断を受けた人: 心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、緑内障、甲状腺機能障害 【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください】
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。