

医薬品を正しく購入するための

説明書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	シンピタエース
2	成分・分量	6 カプセル(1 日量)中 ゴオウ 10mg、ジリュウ乾燥エキス 52mg、キキョウ乾燥エキス 54mg、カンゾウ乾燥エキス 134mg、アセトアミノフェン 540mg、エテンザミド 400mg、無水カフェイン 90mg、クエン酸チペピジン 48mg、d,l-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg、ヘスペリジン 30mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg
3	用法・用量	大人(15 歳以上) 1 回 2 カプセル、1 日 3 回、 小児(7 歳以上 15 歳未満) 1 回 1 カプセル、1 日 3 回、 7 歳未満 服用しないでください。食後なるべく 30 分以内に服用してください。
4	効能・効果	かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください。 (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。 (眠気等があらわれることがあります。) 4. 服用前後は飲酒しないでください。 5. 長期連用しないでください。 次に該当する人はお申し出下さい。 ・医師又は歯科医師の治療を受けている人。・妊婦又は妊娠していると思われる人。・授乳中の人。・水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15 歳未満)。・高齢者。・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。・高熱、排尿困難の症状のある人。・甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障の診断を受けた人。 【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。