

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|-----------------------|--|
| 1 | 名称 | ジクリッチ Z テープ |
| 2 | 成分・分量 | [膏体 100g 中] ジクロフェナクナトリウム…1g |
| 3 | 用法・用量 | ・プラスチックフィルムをはがし、1日1回1～2枚を患部に貼付してください。ただし、1回あたり2枚を超えて使用しないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。 ・15歳未満の小児は使用しないでください。 |
| 4 | 効能・効果 | 関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫 |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | <p>1. 次の人は使用しないでください</p> <p>(1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(2) ぜんそくを起こしたことがある人。</p> <p>(3) 妊婦または妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。</p> <p>2. 次の部位には使用しないでください</p> <p>(1) 目の周囲、粘膜等。</p> <p>(2) 湿疹、かぶれ、傷口。</p> <p>(3) みずむし・たむし等または化膿している患部。</p> <p>3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を併用しないでください</p> <p>4. 連続して2週間以上使用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人。(2) 他の医薬品を使用している人。</p> <p>(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(4) テープ剤でかぶれ等を起こしたことがある人。</p> <p>(5) 次の診断を受けた人。消化性潰瘍、血液障害、肝臓病、腎臓病、高血圧、心臓病、インフルエンザ</p> <p>(6) 次の医薬品の投与を受けている人。ニューキノロン系抗菌剤、トリアムテレン、リチウム、メトトレキサート、非ステロイド性消炎鎮痛剤、ステロイド剤、利尿剤、シクロスポリン、選択的セロトニン再取り込み阻害剤</p> <p>(7) 高齢者。</p> |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | |

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。