

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ジージーコデイン液
2	成分・分量	[成人 1 日最大量(60mL)中] グアイフェネシン 200mg、ジヒドロコデインリン酸塩 30mg、 dl-メチルエフェドリン塩酸塩 70mg、カンゾウエキス 400mg(甘草 1.2g)、 セネガ流エキス 3mL(セネガ 3.0g)
3	用法・用量	添付の目盛り付きコップで次の 1 回量をはかり、いずれも 1 日 4 回毎食後及び就寝前に服用してください。なお、場合により 1 日 6 回まで服用しても差し支えありませんが、この場合は服用間隔を約 4 時間以上おいてください。 成人(15 才以上):1 回 10mL 12 才以上 15 才未満:1 回 6.5mL 12 才未満:服用しないこと
4	効能・効果	せき、たん
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください。 12 才未満の小児 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。 (眠気等があらわれることがある) 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください。 5. 過量服用・長期連用しないでください。 次に該当する方はお申し出ください (1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)高齢者 (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5)次の症状のある人:高熱、むくみ (6)次の診断を受けた人:心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症 【12 才以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。