

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	タイムコール P 錠
2	成分・分量	[成人 1 日量(9 錠)中] イソプロピルアンチピリン 300mg / アセトアミノフェン 450mg / ジヒドロコデインリン酸塩 18mg / dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg / クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg / カンゾウエキス末 90mg(甘草 750mg) / 無水カフェイン 75mg
3	用法・用量	次の 1 回量を 1 日 3 回、食後なるべく 30 分以内に服用してください。 成人(15 才以上):1 回 3 錠 / 12 才以上 15 才未満:1 回 2 錠 / 12 才未満:服用しないこと
4	効能・効果	かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください。 (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 (3)12 才未満の小児 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気等があらわれることがある) 4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。 5. 服用前後は飲酒しないでください。 6. 長期連用しないでください。 次に該当する人はお申し出ください。 (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)高齢者 (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5)次の症状のある人:高熱、排尿困難 (6)次の診断を受けた人:甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症 【12 才以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。