## 医薬品を正しく購入するための

## 説明文書

## 指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	タウロイブ
2	成分・分量	[9 錠(1 日量)中] イブプロフェン 450mg、 ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、 dl-メチルエフェドリン塩 酸塩 60mg、 クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg、 無水カフェイン 75mg、 チアミン硝化物 24mg、 リボフラビン 12mg、 アスコルビン酸 300mg
3	用法・用量	成人(15 才以上)1 回 3 錠、1 日 3 回、 食後なるべく30 分以内に水又はお湯と一緒に服用してください
4	効能・効果	かぜの諸症状(のどの痛み、発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するというでは、必要な事項	1. 次の人は服用しないでください (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 (3)15 才未満の小児 (4)出産予定日 12 週以内の妊婦 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬等) 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 5. 服用前後は飲酒しないこと 次に該当する人はお申し出ください ・医師又は歯科医師の治療を受けている人 ・妊娠又は妊娠していると思われる人 ・高齢者 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・次の症状のある人:高熱、排尿困難 ・次の診断を受けた人:甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、緑内障、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症 ・次の病気にかかったことがある人:胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

## [注意事項]

- 1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。