

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ダルテノン下痢止め									
2	成分・分量	[4錠中] ロペラミド塩酸塩 1mg、ベルベリン塩化物水和物 80mg、 アクリノール水和物 80mg									
3	用法・用量	下記の量を水又はぬるま湯で服用してください。ただし、下痢が止まれば服用しないでください。また、服用間隔は4時間以上おいてください。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>1回量</th> <th>1日服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人(15歳以上)</td> <td>2錠</td> <td>2回</td> </tr> <tr> <td>15歳未満</td> <td colspan="2">服用しないでください。</td> </tr> </tbody> </table>	年齢	1回量	1日服用回数	成人(15歳以上)	2錠	2回	15歳未満	服用しないでください。	
年齢	1回量	1日服用回数									
成人(15歳以上)	2錠	2回									
15歳未満	服用しないでください。										
4	効能・効果	下痢、食べすぎ・飲みすぎによる下痢、寝冷えによる下痢、腹痛を伴う下痢、食あたり、水あたり、軟便									
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないでください。 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。 胃腸鎮痛鎮痙薬</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。</p> <p>4. 服用前後は飲酒しないでください。</p> <p>次に該当する人はお申し出ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人。 ・発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。 ・急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。 ・便秘を避けなければならない肛門疾患等のある人。 ・妊娠又は妊娠していると思われる人。 ・授乳中の人。 ・高齢者。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 									
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項										

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。