

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | 名称                                | ピロヘラーS 点鼻薬  |
| 2 | 成分・分量                             | 30mL 中<br>ナファゾリン塩酸塩 15mg / クロルフェニラミンマレイン酸塩 30mg /<br>ベンゼトニウム塩化物 3mg   |
| 3 | 用法・用量                             | 次の1回量を鼻腔内に噴霧してください。<br>なお、3時間以上の間隔をおいて1日1~5回使用できます。<br>成人(15才以上):1回1~2度ずつ / 7才以上15才未満:1回1~2度ずつ /<br>7才未満:使用しないこと  |
| 4 | 効能・効果                             | 急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和:鼻づまり、<br>鼻みず(鼻汁過多)、くしゃみ、頭重   |
| 5 | 保健衛生上の<br>危害を防止<br>するために<br>必要な事項 | 1. 長期連用しないでください。<br>次に該当する人はお申し出ください。<br>(1) 医師の治療を受けている人<br>(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人<br>(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人<br>(4) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障 |
| 6 | 薬剤師または<br>登録販売者が<br>必要と判断<br>する事項 |   |

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。