

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	フスコンZ液
2	成分・分量	[40mL(成人1日服用量)中] オンジ流エキス 0.8mL(遠志 800mg)／グアイフェネシン 200mg／dl-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg／ジプロフィリン 100mg／クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg／カンゾウ流エキス 1.2mL(甘草 1200mg)／キョウニンエキス 100mg(杏仁 1000mg)／バクモンドウ流エキス 1.6mL(麦門冬 1600mg)
3	用法・用量	添付の目盛りつきコップで次の1回量をはかり、いずれも1日4回、毎食後及び就寝前に服用してください。 成人(15才以上):1回 10mL / 11才以上 15才未満:1回 6.5mL / 8才以上 11才未満:1回 5mL / 5才以上 8才未満:1回 3mL / 3才以上 5才未満:1回 2.5mL / 1才以上 3才未満:1回 2mL / 3ヵ月以上 1才未満:1回 1mL / 3ヵ月未満:服用しないこと
4	効能・効果	喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅー)をともなうせき、せき、たん
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気等があらわれることがある) 3. 長期連用しないでください。 次に該当する人はお申し出ください。 (1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)授乳中の人 (4)高齢者 (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6)次の症状のある人:高熱、むくみ、排尿困難 (7)次の診断を受けた人:心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、緑内障、甲状腺機能障害、てんかん 【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。