

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ポレガード
2	成分・分量	4錠(成人1日服用量)中:アゼラスチン塩酸塩 2mg
3	用法・用量	下記1回量を1日2回、朝食後及び就寝前に服用してください。 成人(15歳以上):2錠、小児(15歳未満):服用しないこと ただし、鼻炎の症状に用いる場合は1週間、皮膚の症状に用いる場合は3日間使用しても症状の改善がみられない場合には服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
4	効能・効果	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和: くしゃみ、鼻みず、鼻づまり じんましん、湿疹・かぶれによる次の症状の緩和:皮膚のはれ、かゆみ
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 次の人は服用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)15歳未満の小児。 (3)妊娠又は妊娠していると思われる人。 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> 他のアレルギー用薬(皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む)、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乘物酔い薬、催眠鎮静薬) 3. 服用前後は飲酒しないでください。 4. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。 <ul style="list-style-type: none"> (眠気等があらわれることがあります。) 5. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。 6. 長期連用しないでください。 <p>次に該当する人はお申し出ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人。 ・高齢者。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・アトピー性皮膚炎、またはアトピー素因があると診断を受けた人。 ・気管支ぜんそくの診断を受けた人。 ・発熱やせき、黄色で粘りのある鼻みずなどのかぜ症状がある人。 ・鼻炎の場合でアレルギー性鼻炎か、かぜによる鼻炎かわからない人、又は、皮膚の症状が「じんましん、湿疹・かぶれ」によるものか、虫さされや化膿等他の原因によるものかわからない人。
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。