

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	リバイチン S									
2	成分・分量	[15錠(成人1日服用量)中] ジオウ … 800mg サンヤク … 400mg ブクリヨウ … 400mg サンシュユ … 400mg タクシャ … 400mg ボタンピ … 400mg ケイヒ … 133mg ブシ末 … 67mg ニンジン … 400mg									
3	用法・用量	次の量を食後に、水またはお湯でかまずに服用してください。 <table border="1"><thead><tr><th>年齢</th><th>1回量</th><th>1日服用回数</th></tr></thead><tbody><tr><td>成人(15歳以上)</td><td>5錠</td><td>3回</td></tr><tr><td>15歳未満</td><td colspan="2">服用しないでください</td></tr></tbody></table>	年齢	1回量	1日服用回数	成人(15歳以上)	5錠	3回	15歳未満	服用しないでください	
年齢	1回量	1日服用回数									
成人(15歳以上)	5錠	3回									
15歳未満	服用しないでください										
4	効能・効果	疲れやすく、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で時に口渴がある次の諸症： 下肢痛、腰痛、しびれ、老人のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、倦怠感、肩こり									
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください。 (1) 胃腸の弱い人 (2) 下痢しやすい人 次に該当する人はお申し出ください。 (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人 (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人									
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項										

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。