

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	レバコール
2	成分・分量	1 日量(10mL) 中 パンリバー末 100mg、チオクト酸 5mg、パントテン酸カルシウム 10mg、 重酒石酸コリン 20mg、イノシトール 5mg、タウリン 30mg、 ニコチン酸アミド 40mg、グルクロノラクトン 5mg、 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 5mg、 カフェイン水和物 10mg、チアミン硝化物(ビタミン B1) 10mg、 リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミン B2) 3mg、 ピリドキシン塩酸塩(ビタミン B6) 0.5mg、シアノコバラミン(ビタミン B12) 3 μ g、 L-グルタミン酸ナトリウム水和物 15mg、L-トレオニン 1.5mg、 クエン酸鉄アンモニウム 30mg、ヨクイニンエキス(ヨクイニン煎出液) 3mL、 グリチルリチン酸二アンモニウム 3mg (アルコール 0.5mL 以下)
3	用法・用量	大人(16 才以上) 1 回 10mL 1 日 1 回 または 1 回 5mL 1 日 2 回、 8 才以上 16 才未満 1 回 5mL 1 日 1 回、 5 才以上 8 才未満 1 回 3mL 1 日 1 回 服用してください 5 才未満 服用しないこと ※添付の計量コップをご使用ください。
4	効能・効果	○滋養強壮 ○虚弱体質 ○肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの 場合の栄養補給
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。