

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ワコン M ゴールド錠「長城」																															
2	成分・分量	[2 錠中] <table><tr><td>ゴオウ</td><td>… 6mg</td><td>エゾウコギ乾燥エキス</td><td>… 22.22mg</td></tr><tr><td>ロクジョウ末</td><td>… 40mg</td><td>オウギ乾燥エキス</td><td>… 15mg</td></tr><tr><td>オキソアミジン末</td><td>… 100mg</td><td>ゴミシ乾燥エキス</td><td>… 55.56mg</td></tr><tr><td>イカリソウ乾燥エキス</td><td>… 83.33mg</td><td>チアミン硝化物</td><td>… 10mg</td></tr><tr><td>ニクジュヨウ末</td><td>… 66.67mg</td><td>リボフラビン</td><td>… 2mg</td></tr><tr><td>ジャショウシエキス</td><td>… 33.33mg</td><td>ピリドキシン塩酸塩</td><td>… 10mg</td></tr><tr><td>トシシエキス</td><td>… 32.97mg</td><td>無水カフェイン</td><td>… 20mg</td></tr></table>				ゴオウ	… 6mg	エゾウコギ乾燥エキス	… 22.22mg	ロクジョウ末	… 40mg	オウギ乾燥エキス	… 15mg	オキソアミジン末	… 100mg	ゴミシ乾燥エキス	… 55.56mg	イカリソウ乾燥エキス	… 83.33mg	チアミン硝化物	… 10mg	ニクジュヨウ末	… 66.67mg	リボフラビン	… 2mg	ジャショウシエキス	… 33.33mg	ピリドキシン塩酸塩	… 10mg	トシシエキス	… 32.97mg	無水カフェイン	… 20mg
ゴオウ	… 6mg	エゾウコギ乾燥エキス	… 22.22mg																														
ロクジョウ末	… 40mg	オウギ乾燥エキス	… 15mg																														
オキソアミジン末	… 100mg	ゴミシ乾燥エキス	… 55.56mg																														
イカリソウ乾燥エキス	… 83.33mg	チアミン硝化物	… 10mg																														
ニクジュヨウ末	… 66.67mg	リボフラビン	… 2mg																														
ジャショウシエキス	… 33.33mg	ピリドキシン塩酸塩	… 10mg																														
トシシエキス	… 32.97mg	無水カフェイン	… 20mg																														
3	用法・用量	下記 1 回量を 1 日 1 回服用してください。 <table><tr><td>年齢</td><td>1 回量</td></tr><tr><td>成人(15 歳以上)</td><td>2 錠</td></tr><tr><td>15 歳未満</td><td>服用しないこと</td></tr></table>				年齢	1 回量	成人(15 歳以上)	2 錠	15 歳未満	服用しないこと																						
年齢	1 回量																																
成人(15 歳以上)	2 錠																																
15 歳未満	服用しないこと																																
4	効能・効果	滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾病・妊娠授乳期などの場合の栄養補給																															
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次に該当する人はお申し出ください。 ・医師の治療を受けている人 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人																															
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項																																

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。