

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	五苓散料エキス錠〔大峰〕													
2	成分・分量	[12錠(1日量)中] タクシャ 2.5g、ビャクジュツ 1.5g、チヨレイ 1.5g、ケイヒ 1.0g、ブクリヨウ 1.5g 上記生薬より得た五苓散料エキス(1/2量)1050mgを含みます。													
3	用法・用量	次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。 (食間とは、食後2～3時間を指します。) <table border="1"><thead><tr><th>年齢</th><th>1回量</th><th>1日服用回数</th></tr></thead><tbody><tr><td>成人(15歳以上)</td><td>4錠</td><td rowspan="3">3回</td></tr><tr><td>15歳未満7歳以上</td><td>3錠</td></tr><tr><td>7歳未満5歳以上</td><td>2錠</td></tr><tr><td>5歳未満</td><td colspan="2">服用しないでください</td></tr></tbody></table>	年齢	1回量	1日服用回数	成人(15歳以上)	4錠	3回	15歳未満7歳以上	3錠	7歳未満5歳以上	2錠	5歳未満	服用しないでください	
年齢	1回量	1日服用回数													
成人(15歳以上)	4錠	3回													
15歳未満7歳以上	3錠														
7歳未満5歳以上	2錠														
5歳未満	服用しないでください														
4	効能・効果	体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症： 水様性下痢、急性胃腸炎(しぶり腹 <sup>注</sup> )のものには使用しないこと)、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔 注)しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことです。													
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次に該当する人はお申し出ください。 ・医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。													
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項														

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。