

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	防風通聖散エキス錠(大峰)
2	成分・分量	12錠(1日量)中 トウキ 0.6g、シャクヤク 0.6g、センキュウ 0.6g、サンシシ 0.6g、 レンギョウ 0.6g、ハッカ 0.6g、ショウキョウ 0.2g、ケイガイ 0.6g、 ポウフウ 0.6g、マオウ 0.6g、ダイオウ 0.75g、乾燥硫酸ナトリウム 0.375g、 ビャクジュツ 1.0g、キキョウ 1.0g、オウゴン 1.0g、カンゾウ 1.0g、 セッコウ 1.0g、カッセキ 1.5g 上記生薬より得た防風通聖散エキス粉末 2750mg を含みます。
3	用法・用量	成人(15歳以上) 1回4錠、1日3回、15歳未満7歳以上 1回3錠、1日3回、 7歳未満5歳以上 1回2錠、1日3回、5歳未満 服用しないで下さい。 食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。 (食間とは、食後2~3時間を指します。)
4	効能・効果	体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症： 高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、 湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。：他の瀉下薬(下剤) 2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。 次に該当する人はお申し出下さい。 ・医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。 ・胃腸が弱く下痢しやすい人。 ・発汗傾向の著しい人。 ・高齢者。 ・今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。 ・むくみ、排尿困難の症状のある人。 ・高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害の診断を受けた人。
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。