

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	小児用ツーランシロップ
2	成分・分量	48mL 中 アセトアミノフェン 300mg / クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.4mg / デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 15mg / グアイフェネシン 80mg / 無水カフェイン 48mg / 小青竜湯流エキス 4mL(マオウ・シャクヤク・ケイヒ・サイ シン・ゴモシ各0.5g、カンゾウ・ショウキョウ各0.33g、ハンゲ0.83g)
3	用法・用量	次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内及び必要な場合には就寝前に服用 してください。場合によっては、1日6回まで服用しても差し支えありませんが、その 場合には原則として、約4時間の間隔をおいて服用してください。 3才以上7才未満:1回8mL / 1才以上3才未満:1回6mL / 6ヵ月以上1才未満:1回4.5mL / 3ヵ月以上6ヵ月未満:1回4mL / 3ヵ月未満:服用しないこと
4	効能・効果	かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭 痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は服用しないでください。 (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服 薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気等があらわれる ことがある) 4. 服用時は飲酒しないでください。 5. 長期連用しないでください。 次に該当する人はお申し出ください。 (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)高齢者 (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5)次の症状のある人: 高熱、排尿困難 (6)次の診断を受けた人: 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎 臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障 【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の
薬剤師または登録販売者にご相談下さい。