

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第三類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	新オキソピタン錠								
2	成分・分量	[9錠中] 理研オキソレデン末 … 1,000mg チアミン硝酸化物(ビタミン B ₁) … 26mg リボフラビン(ビタミン B ₂) … 5mg ガンマーオリザノール … 10mg								
3	用法・用量	1日3回、食後に服用してください。 <table border="1"><thead><tr><th>年齢</th><th>1回服用量</th></tr></thead><tbody><tr><td>成人(15歳以上)</td><td>3錠</td></tr><tr><td>7歳以上 15歳未満</td><td>1錠</td></tr><tr><td>7歳未満</td><td>服用しないでください</td></tr></tbody></table>	年齢	1回服用量	成人(15歳以上)	3錠	7歳以上 15歳未満	1錠	7歳未満	服用しないでください
年齢	1回服用量									
成人(15歳以上)	3錠									
7歳以上 15歳未満	1錠									
7歳未満	服用しないでください									
4	効能・効果	○ 次の諸症状の緩和: 神経痛、筋肉痛・関節痛(肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労(慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み) ○ 脚気 ○ 次の場合のビタミン B ₁ の補給: 肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下								
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項									
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項									

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。