

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	新タウロ感冒ブルーα
2	成分・分量	[3包(1日量)中] 柴胡桂枝湯エキス 1200mg、アセトアミノフェン 900mg、 クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg、 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 36mg、 グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg、無水カフェイン 90mg、 dl-メチルエフェドリン塩酸塩 45mg、チアミン硝化物 24mg、リボフラビン 12mg
3	用法・用量	成人(15才以上) 1回 1包、7才以上15才未満 1回 1/2包 1日3回食後なるべく30分以内に水またはお湯と一緒に服用してください 7才未満 服用しないこと
4	効能・効果	かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないこと (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと (眠気等があらわれることがある) 4. 服用前後は飲酒しないこと 5. 長期連用しないこと 次に該当する人はお申し出ください ・医師又は歯科医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・授乳中の人 ・高齢者 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・次の症状のある人 高熱、排尿困難 ・次の診断を受けた人 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障 【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。