

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | 名称 | 新ピロヘラ一点鼻薬 |
| 2 | 成分・分量 | 15mL 中 ナファゾリン塩酸塩 7.5mg / クロルフェニラミンマレイン酸塩 15mg / ベンゼトニウム塩化物 1.5mg |
| 3 | 用法・用量 | 次の1回量を鼻腔内に噴霧してください。 なお、3時間以上の間隔をおいて、1日6回まで使用できます。 成人(15才以上):1回1~2度ずつ / 15才未満:使用しないこと |
| 4 | 効能・効果 | 急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和:鼻づまり、鼻みず(鼻汁過多)、くしゃみ、頭重 |
| 5 | 保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項 | 1. 長期連用しないでください。 次に該当する人はお申し出ください。 (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障 |
| 6 | 薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項 | |

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。