

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	新プロストマック
2	成分・分量	成人1日量(3包)中 ゲファルナート150mg / アズレンスルホン酸ナトリウム6mg / L-グルタミン400mg / メタケイ酸アルミン酸マグネシウム2268mg / ロートエキス散(10倍散)300mg / ショウキョウ末150mg
3	用法・用量	次の1回量を1日3回、食間又は食後に水又はぬるま湯で服用してください。 成人(15才以上):1回1包 / 小児(15才未満):服用しないこと
4	効能・効果	胃痛、もたれ(胃もたれ)、胸やけ、飲みすぎ、胃酸過多、胃重、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、胸つかえ、げっぷ、胃部不快感、胃部膨満感
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください。 透析療法を受けている人 2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。 胃腸鎮痛鎮痙薬 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。 (目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。) 4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください。(母乳に移行して乳児の脈が速くなる場合があります。) 5. 長期連用しないでください。  次に該当する人はお申し出ください。 (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 次の症状のある人: 排尿困難 (6) 次の診断を受けた人: 腎臓病、心臓病、甲状腺機能障害、緑内障
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。