

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ニッポーの半夏瀉心湯エキス顆粒 [東洋の半夏瀉心湯エキス顆粒(分包)]															
2	成分・分量	[本品 1 日量 3 包(1 包 3.0g)中] 日本薬局方 ハンゲ 5.0g 日本薬局方 カンゾウ 2.5g 日本薬局方 オウゴン 2.5g 日本薬局方 タイソウ 2.5g 日本薬局方 カンキョウ 2.5g 日本薬局方 オウレン 1.0g 日本薬局方 ニンジン 2.5g より製した水製乾燥エキス 3.44g															
3	用法・用量	下記の量を食間又は空腹時に水又は温湯にて服用してください。 <table border="1"><thead><tr><th>年齢</th><th>1 回量</th><th>1 日服用回数</th></tr></thead><tbody><tr><td>大人(15 才以上)</td><td>1 包</td><td rowspan="4">3 回</td></tr><tr><td>15 才未満 7 才以上</td><td>2/3 包</td></tr><tr><td>7 才未満 4 才以上</td><td>1/2 包</td></tr><tr><td>4 才未満 2 才以上</td><td>1/3 包</td></tr><tr><td>2 才未満</td><td colspan="2">服用しないこと</td></tr></tbody></table>	年齢	1 回量	1 日服用回数	大人(15 才以上)	1 包	3 回	15 才未満 7 才以上	2/3 包	7 才未満 4 才以上	1/2 包	4 才未満 2 才以上	1/3 包	2 才未満	服用しないこと	
年齢	1 回量	1 日服用回数															
大人(15 才以上)	1 包	3 回															
15 才未満 7 才以上	2/3 包																
7 才未満 4 才以上	1/2 包																
4 才未満 2 才以上	1/3 包																
2 才未満	服用しないこと																
4	効能・効果	みぞおちがつかえ、時に悪心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便又は下痢の傾向にあるものの次の諸症：急・慢性胃腸カタル、醗酵性下痢、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症															
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次に該当する人はお申し出下さい ・医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・高齢者。 ・今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。 ・次の症状のある人。：むくみ ・次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病															
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項																

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。