

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ニッポーの桔梗湯エキス顆粒 S（東洋の桔梗湯エキス顆粒 S）																	
2	成分・分量	[本品1日量 3 包（1 包 1.5g）中] 日本薬局方 キキョウ … 2.0g 日本薬局方 カンゾウ … 3.0g より製した水製乾燥エキス … 1.25g																	
3	用法・用量	<table><tr><th>年齢</th><th>1 回量</th><th>1 日服用回数</th></tr><tr><td>大人（15 才以上）</td><td>1 包</td><td rowspan="4">3 回</td></tr><tr><td>15 才未満 7 才以上</td><td>2/3 包</td></tr><tr><td>7 才未満 4 才以上</td><td>1/2 包</td></tr><tr><td>4 才未満 2 才以上</td><td>1/3 包</td></tr><tr><td>2 才未満</td><td colspan="2">服用しないこと</td></tr></table> 上記の量を、食前又は食間に少しずつ口中に含み、水又は白湯で徐々に溶かして服用してください。			年齢	1 回量	1 日服用回数	大人（15 才以上）	1 包	3 回	15 才未満 7 才以上	2/3 包	7 才未満 4 才以上	1/2 包	4 才未満 2 才以上	1/3 包	2 才未満	服用しないこと	
年齢	1 回量	1 日服用回数																	
大人（15 才以上）	1 包	3 回																	
15 才未満 7 才以上	2/3 包																		
7 才未満 4 才以上	1/2 包																		
4 才未満 2 才以上	1/3 包																		
2 才未満	服用しないこと																		
4	効能・効果	咽喉がはれて痛む次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎																	
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次に該当する人はお申し出ください。 ・医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・胃腸が弱く下痢しやすい人。 ・高齢者。 ・次の症状がある人。：むくみ ・次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病																	
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項																		

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。