

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| 1 | 名称 | 東洋の五苓散料エキス顆粒(分包) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---|------------|------|------------|-----------|-------------|------|--------------|------|-----------|------|------|---------|-------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|------------|-------|--|--|
| 2 | 成分・分量 | <p>[本品 1 日量 3 包(1 包 1.5g)中]</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>日本薬局方 タクシャ</td> <td>2.0g</td> <td>日本薬局方 チョレイ</td> <td>1.5g</td> </tr> <tr> <td>日本薬局方 ブクリョウ</td> <td>1.5g</td> <td>日本薬局方 ビャクジュツ</td> <td>1.5g</td> </tr> <tr> <td>日本薬局方 ケイヒ</td> <td>1.0g</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>より製した水製乾燥エキス 1.05g</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>日本薬局方 タクシャ末</td> <td>0.60g</td> <td>日本薬局方 チョレイ末</td> <td>0.45g</td> </tr> <tr> <td>日本薬局方 ブクリョウ末</td> <td>0.45g</td> <td>日本薬局方 ビャクジュツ末</td> <td>0.45g</td> </tr> <tr> <td>日本薬局方 ケイヒ末</td> <td>0.30g</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 日本薬局方 タクシャ | 2.0g | 日本薬局方 チョレイ | 1.5g | 日本薬局方 ブクリョウ | 1.5g | 日本薬局方 ビャクジュツ | 1.5g | 日本薬局方 ケイヒ | 1.0g | | | 日本薬局方 タクシャ末 | 0.60g | 日本薬局方 チョレイ末 | 0.45g | 日本薬局方 ブクリョウ末 | 0.45g | 日本薬局方 ビャクジュツ末 | 0.45g | 日本薬局方 ケイヒ末 | 0.30g | | |
| 日本薬局方 タクシャ | 2.0g | 日本薬局方 チョレイ | 1.5g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本薬局方 ブクリョウ | 1.5g | 日本薬局方 ビャクジュツ | 1.5g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本薬局方 ケイヒ | 1.0g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本薬局方 タクシャ末 | 0.60g | 日本薬局方 チョレイ末 | 0.45g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本薬局方 ブクリョウ末 | 0.45g | 日本薬局方 ビャクジュツ末 | 0.45g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本薬局方 ケイヒ末 | 0.30g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 用法・用量 | <p>下記の量を食間又は空腹時に水又は温湯にて服用してください。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>1回量</th> <th>1日服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大人(15才以上)</td> <td>1包</td> <td rowspan="3">3回</td> </tr> <tr> <td>15才未満 7才以上</td> <td>2/3包</td> </tr> <tr> <td>7才未満 4才以上</td> <td>1/2包</td> </tr> <tr> <td>4才未満</td> <td>服用しないこと</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 | 大人(15才以上) | 1包 | 3回 | 15才未満 7才以上 | 2/3包 | 7才未満 4才以上 | 1/2包 | 4才未満 | 服用しないこと | | | | | | | | | | | | |
| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大人(15才以上) | 1包 | 3回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15才未満 7才以上 | 2/3包 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7才未満 4才以上 | 1/2包 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4才未満 | 服用しないこと | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 効能・効果 | のどが渴いて、尿量が少なく、はき気、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：水瀉性下痢、急性胃腸炎(しぶり腹のものには使用しないこと)、暑気あたり、頭痛、むくみ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。