

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	東洋の疎経活血湯(そけいかっけつとう)																																				
2	成分・分量	<p>本品 1 包(1 日量)27.5g 中</p> <table border="0"> <tr> <td>日本薬局方 トウキ</td> <td>2.0g</td> <td>日本薬局方 ジオウ</td> <td>2.0g</td> </tr> <tr> <td>日本薬局方 ソウジュツ</td> <td>2.0g</td> <td>日本薬局方 センキュウ</td> <td>2.0g</td> </tr> <tr> <td>日本薬局方 トウニン</td> <td>2.0g</td> <td>日本薬局方 ブクリョウ</td> <td>2.0g</td> </tr> <tr> <td>日本薬局方 シャクヤク</td> <td>2.5g</td> <td>日本薬局方 ゴシツ</td> <td>1.5g</td> </tr> <tr> <td>日本薬局方 イレイセン</td> <td>1.5g</td> <td>日本薬局方 ボウイ</td> <td>1.5g</td> </tr> <tr> <td>日本薬局方 キョウカツ</td> <td>1.5g</td> <td>日本薬局方 ボウフウ</td> <td>1.5g</td> </tr> <tr> <td>日本薬局方 リュウタン</td> <td>1.5g</td> <td>日本薬局方 ショウキョウ</td> <td>0.5g</td> </tr> <tr> <td>日本薬局方 チンピ</td> <td>1.5g</td> <td>日本薬局方 ビヤクシ</td> <td>1.0g</td> </tr> <tr> <td>日本薬局方 カンゾウ</td> <td>1.0g</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	日本薬局方 トウキ	2.0g	日本薬局方 ジオウ	2.0g	日本薬局方 ソウジュツ	2.0g	日本薬局方 センキュウ	2.0g	日本薬局方 トウニン	2.0g	日本薬局方 ブクリョウ	2.0g	日本薬局方 シャクヤク	2.5g	日本薬局方 ゴシツ	1.5g	日本薬局方 イレイセン	1.5g	日本薬局方 ボウイ	1.5g	日本薬局方 キョウカツ	1.5g	日本薬局方 ボウフウ	1.5g	日本薬局方 リュウタン	1.5g	日本薬局方 ショウキョウ	0.5g	日本薬局方 チンピ	1.5g	日本薬局方 ビヤクシ	1.0g	日本薬局方 カンゾウ	1.0g		
日本薬局方 トウキ	2.0g	日本薬局方 ジオウ	2.0g																																			
日本薬局方 ソウジュツ	2.0g	日本薬局方 センキュウ	2.0g																																			
日本薬局方 トウニン	2.0g	日本薬局方 ブクリョウ	2.0g																																			
日本薬局方 シャクヤク	2.5g	日本薬局方 ゴシツ	1.5g																																			
日本薬局方 イレイセン	1.5g	日本薬局方 ボウイ	1.5g																																			
日本薬局方 キョウカツ	1.5g	日本薬局方 ボウフウ	1.5g																																			
日本薬局方 リュウタン	1.5g	日本薬局方 ショウキョウ	0.5g																																			
日本薬局方 チンピ	1.5g	日本薬局方 ビヤクシ	1.0g																																			
日本薬局方 カンゾウ	1.0g																																					
3	用法・用量	<p>大人(15才以上)は1包(1日量)につき水400mLを加えて約半量になるまで煮詰め、紙袋とともに煎じかすを取り去り、煎液を食前又は食間2回に分けて服用する。</p> <p>小人は同様に煎じて15才未満7才以上は大人の2/3量、7才未満4才以上は大人の1/2量、4才未満2才以上は大人の1/3量、2才未満は大人の1/4量を食前又は食間2回に分けて服用する。</p>																																				
4	効能・効果	関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛																																				
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないこと 生後3カ月未満の乳児。</p> <p>次に該当する人はお申し出ください。</p> <p>(1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)胃腸が弱く下痢しやすい人。 (4)高齢者。 (5)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。 (6)次の症状のある人。:むくみ (7)次の診断を受けた人。:高血圧、心臓病、腎臓病</p>																																				
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項																																					

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。