

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	東洋漢方の加味逍遙散料(かみしょうようさんりょう)																				
2	成分・分量	<p>本品 1 包(1 日量)22.5g 中</p> <table border="0"> <tr> <td>日本薬局方 トウキ</td> <td>3.0g</td> <td>日本薬局方 シャクヤク</td> <td>3.0g</td> </tr> <tr> <td>日本薬局方 ビャクジュツ</td> <td>3.0g</td> <td>日本薬局方 ブクリヨウ</td> <td>3.0g</td> </tr> <tr> <td>日本薬局方 サイコ</td> <td>3.0g</td> <td>日本薬局方 ボタンピ</td> <td>2.0g</td> </tr> <tr> <td>日本薬局方 サンシシ</td> <td>2.0g</td> <td>日本薬局方 カンゾウ</td> <td>1.5g</td> </tr> <tr> <td>日本薬局方 ショウキョウ</td> <td>1.0g</td> <td>日本薬局方 ハッカ</td> <td>1.0g</td> </tr> </table>	日本薬局方 トウキ	3.0g	日本薬局方 シャクヤク	3.0g	日本薬局方 ビャクジュツ	3.0g	日本薬局方 ブクリヨウ	3.0g	日本薬局方 サイコ	3.0g	日本薬局方 ボタンピ	2.0g	日本薬局方 サンシシ	2.0g	日本薬局方 カンゾウ	1.5g	日本薬局方 ショウキョウ	1.0g	日本薬局方 ハッカ	1.0g
日本薬局方 トウキ	3.0g	日本薬局方 シャクヤク	3.0g																			
日本薬局方 ビャクジュツ	3.0g	日本薬局方 ブクリヨウ	3.0g																			
日本薬局方 サイコ	3.0g	日本薬局方 ボタンピ	2.0g																			
日本薬局方 サンシシ	2.0g	日本薬局方 カンゾウ	1.5g																			
日本薬局方 ショウキョウ	1.0g	日本薬局方 ハッカ	1.0g																			
3	用法・用量	<p>1 包(1 日量)を和紙袋入りのまま、水 400mL を加え、半量位まで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、食間に服用する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>1 包(1 日量)煎じ液</th> <th>1 日服用量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大人(15 才以上)</td> <td>全量</td> <td>3 回に分けて</td> </tr> <tr> <td>15 才未満</td> <td colspan="2">服用しないこと</td> </tr> </tbody> </table>	年齢	1 包(1 日量)煎じ液	1 日服用量	大人(15 才以上)	全量	3 回に分けて	15 才未満	服用しないこと												
年齢	1 包(1 日量)煎じ液	1 日服用量																				
大人(15 才以上)	全量	3 回に分けて																				
15 才未満	服用しないこと																					
4	効能・効果	<p>体質虚弱な婦人で、肩がこり、疲れやすく、精神不安などの精神神経症状、ときに便秘の傾向のある次の諸症：冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症</p> <p>(血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。)</p>																				
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>次に該当する人はお申し出ください。</p> <p>(1)医師の治療を受けている人。</p> <p>(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。</p> <p>(3)胃腸の弱い人。</p> <p>(4)高齢者。</p> <p>(5)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。</p> <p>(6)次の症状のある人。：むくみ</p> <p>(7)次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病</p>																				
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項																					

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。