

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	當歸芍薬散料(とうきしゃくやくさんりょう)														
2	成分・分量	本品 1 包(1 日量)24.0g 中 日本薬局方 トウキ 3.0g 日本薬局方 センキュウ 3.0g 日本薬局方 シャクヤク 6.0g 日本薬局方 ブクリョウ 4.0g 日本薬局方 バクジュツ 4.0g 日本薬局方 タクシャ 4.0g														
3	用法・用量	1 包(1 日量)につき水 400mL を加えあまり強くない火にかけ 200mL に煮つめ、紙袋とともに煎じかすを取り去り、食前 1 時間前又は食間空腹時に温服する。 <table><tr><td>年齢</td><td>1 包(1 日量)煎じ液</td><td>1 日服用量</td></tr><tr><td>大人(15 才以上)</td><td>全量</td><td>3～2 回に分けて</td></tr><tr><td>15 才未満 7 才以上</td><td>2／3 量</td><td rowspan="2">3 回に分けて</td></tr><tr><td>7 才未満 4 才以上</td><td>1／2 量</td></tr><tr><td>4 才未満</td><td colspan="2">服用しないこと</td></tr></table>	年齢	1 包(1 日量)煎じ液	1 日服用量	大人(15 才以上)	全量	3～2 回に分けて	15 才未満 7 才以上	2／3 量	3 回に分けて	7 才未満 4 才以上	1／2 量	4 才未満	服用しないこと	
年齢	1 包(1 日量)煎じ液	1 日服用量														
大人(15 才以上)	全量	3～2 回に分けて														
15 才未満 7 才以上	2／3 量	3 回に分けて														
7 才未満 4 才以上	1／2 量															
4 才未満	服用しないこと															
4	効能・効果	比較的体力が乏しく、冷え症で貧血の傾向があり、疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴える次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害(貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ)めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ。														
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次に該当する人はお申し出ください。 (1)医師の治療を受けている人。 (2)胃腸の弱い人。 (3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。														
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項															

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。