

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	當帰芍薬散(顆粒)													
2	成分・分量	[本品 1 日量 3 包(1 包 1.5g) 中] ( 日本薬局方 トウキ 1.5g 日本薬局方 センキュウ 1.5g ) ( 日本薬局方 シャクヤク 3.0g 日本薬局方 ブクリョウ 2.0g ) ( 日本薬局方 ビャクジュツ 2.0g 日本薬局方 タクシャ 2.0g ) より製した水製乾燥エキス 1.5g 日本薬局方 トウキ末 0.375g 日本薬局方 センキュウ末 0.375g 日本薬局方 シャクヤク末 0.75g 日本薬局方 ブクリョウ末 0.5g 日本薬局方 ビャクジュツ末 0.5g 日本薬局方 タクシャ末 0.5g													
3	用法・用量	下記の量を食前又は空腹時に水又は白湯にて服用してください。 <table border="1"><thead><tr><th>年齢</th><th>1 回量</th><th>1 日服用回数</th></tr></thead><tbody><tr><td>大人(15 才以上)</td><td>1 包</td><td rowspan="3">3 回</td></tr><tr><td>15 才未満 7 才以上</td><td>2/3 包</td></tr><tr><td>7 才未満 4 才以上</td><td>1/2 包</td></tr><tr><td>4 才未満</td><td colspan="2">服用しないこと</td></tr></tbody></table>	年齢	1 回量	1 日服用回数	大人(15 才以上)	1 包	3 回	15 才未満 7 才以上	2/3 包	7 才未満 4 才以上	1/2 包	4 才未満	服用しないこと	
年齢	1 回量	1 日服用回数													
大人(15 才以上)	1 包	3 回													
15 才未満 7 才以上	2/3 包														
7 才未満 4 才以上	1/2 包														
4 才未満	服用しないこと														
4	効能・効果	比較的体力が乏しく、冷え症で貧血の傾向があり、疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴える次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害(貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ)めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え、しもやけ、むくみ、しみ。													
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次に該当する人はお申し出下さい ・医師の治療を受けている人。 ・胃腸の弱い人。 ・今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。													
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項														

## 【注意事項】

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。