

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	セイビトウ錠																								
2	成分・分量	<p>[大人 1 日量 24 錠中]</p> <table border="0"> <tr> <td>日局カッコン</td> <td>… 0.6g</td> <td>日局ダイオウ</td> <td>… 0.3g</td> </tr> <tr> <td>日局マオウ</td> <td>… 0.3g</td> <td>日局カンゾウ</td> <td>… 0.2g</td> </tr> <tr> <td>日局ケイヒ</td> <td>… 0.3g</td> <td>日局ヨクイニン</td> <td>… 0.2g</td> </tr> <tr> <td>日局シャクヤク</td> <td>… 0.3g</td> <td>日局キキョウ</td> <td>… 0.3g</td> </tr> <tr> <td>日局ショウキョウ</td> <td>… 0.2g</td> <td>日局セッコウ</td> <td>… 0.5g</td> </tr> <tr> <td>日局センキュウ</td> <td>… 0.3g</td> <td>日局シンイ</td> <td>… 0.3g</td> </tr> </table> <p>日局カッコン 2.0g、日局マオウ 1.0g、日局ケイヒ 0.8g、日局シャクヤク 0.8g、日局ショウキョウ 0.3g、日局センキュウ 0.6g、日局ダイオウ 0.2g、日局カンゾウ 0.3g、日局ヨクイニン 3.0g、日局キキョウ 1.0g、日局シンイ 1.0g、日局タイソウ 2.0g の水製乾燥エキス … 1.0g</p>	日局カッコン	… 0.6g	日局ダイオウ	… 0.3g	日局マオウ	… 0.3g	日局カンゾウ	… 0.2g	日局ケイヒ	… 0.3g	日局ヨクイニン	… 0.2g	日局シャクヤク	… 0.3g	日局キキョウ	… 0.3g	日局ショウキョウ	… 0.2g	日局セッコウ	… 0.5g	日局センキュウ	… 0.3g	日局シンイ	… 0.3g
日局カッコン	… 0.6g	日局ダイオウ	… 0.3g																							
日局マオウ	… 0.3g	日局カンゾウ	… 0.2g																							
日局ケイヒ	… 0.3g	日局ヨクイニン	… 0.2g																							
日局シャクヤク	… 0.3g	日局キキョウ	… 0.3g																							
日局ショウキョウ	… 0.2g	日局セッコウ	… 0.5g																							
日局センキュウ	… 0.3g	日局シンイ	… 0.3g																							
3	用法・用量	<p>大人は 1 回 8 錠ずつ、1 日 3 回食前または食間に、水または白湯にて服用してください。</p> <p>小児用量は、15 歳以下 8 歳まで 1 回 4 錠 4 歳以下 2 歳まで 1 回 2 錠 7 歳以下 5 歳まで 1 回 3 錠</p>																								
4	効能・効果	蓄膿症(副鼻腔炎)、鼻カタル																								
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。 他の瀉下薬(下剤)、他の鼻炎用内服薬</p> <p>2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。</p> <p>3. 長期連用しないでください。</p> <p>次に該当する人はお申し出ください。</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。 (4) 胃腸の弱く下痢しやすい人。 (5) 発汗傾向の著しい人。 (6) 高齢者。 (7) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (8) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害</p>																								
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項																									

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。