

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ニッポーの五苓散粒状(分包) [販売名:長]五苓散粒状(分包)
2	成分・分量	[大人 1 日量 3 包(4.8g) 中] 日局タクシャ … 1.4g 日局ビャクジュツ … 0.84g 日局チヨレイ … 0.84g 日局ケイヒ … 0.56g 日局ブクリョウ … 0.84g 食添シヨ糖脂肪酸エステル … 0.32g
3	用法・用量	大人は 1 回に 1 包(1.6g) ずつ、1 日 3 回食間に服用してください。 小児用量は大人用量を 1 とするとき、 14 歳以下 7 歳まで 2/3 量 3 歳以下 2 歳まで 1/3 量 6 歳以下 4 歳まで 1/2 量 1 歳以下 1/4 量以下
4	効能・効果	のどが渇いて、尿量が少なく、はきけ、嘔吐、腹痛、むくみなどのいずれかが伴う次の諸症：水様性下痢、急性胃腸炎(しびり腹のものには使用しないこと)、暑気あたり、頭痛、むくみ
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次の人は服用しないでください。 生後 3 ヶ月未満の乳児。 次に該当する人はお申し出ください。 (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。 (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみなどを起こしたことがある人。
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。