

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	SK コール内服液
2	成分・分量	90mL(30mL×3本)中 柴胡桂枝湯濃縮液 45mL (サイコ 5g、ハンゲ 4g、ケイヒ 2.5g、シャクヤク・オウゴン・ニンジン・タイソウ各 2g、カンゾウ 1.5g、シヨウキョウ 1g)
3	用法・用量	次の量を食間に服用してください。 [年齢:1回量:1日服用回数] 成人(15歳以上):1本:3回 15歳未満:服用しないでください 本剤は沈殿を生じることがありますので、よく振りまぜてから服用してください。
4	効能・効果	体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・悪寒・頭痛・はきけなどのあるものの次の諸症: 胃腸炎、かぜの中期から後期の症状
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次に該当する人はお申し出ください。 (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)高齢者。 (4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。 (5)次の症状のある人。 むくみ (6)次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。