

第3類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。


点眼薬

目のかすみ・目の疲れに アイルビーロイヤル

特徴

アイルビーロイヤル は、*赤いビタミンと**黄色いビタミンで、目の疲れを癒し回復させて、かすんだ目や疲れた目を元気にするだいたい黄色の目薬です。

*赤いビタミン:シアノコバラミン(ビタミンB12) **黄色いビタミン:フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム(活性型ビタミンB2)



**コンドロイチン硫酸
エステルナトリウム**

角膜の乾燥を防いで目を保護します。

**ネオスチグミンメチル
硫酸塩**

目の調節機能を活発にし、目のかすみや目の疲れに対して効果をあらわします。

**シアノコバラミン
(ビタミンB12)**

毛様体筋のはたらきを活発にし、目の疲れを改善します。

**フラビンアデニン
ジヌクレオチドナトリウム
(活性型ビタミンB2)**

目の細胞の代謝を促進し、明るさの変化に順応する機能の低下等を改善します。

**ピリドキシン塩酸塩
(ビタミンB6)**

視神経のはたらきを整え新陳代謝を促進し、目の疲れに効果をあらわします。

タウリン

目に栄養を与え、新陳代謝を促進し、目の疲れに効果をあらわします。



相談すること



使用上の注意

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。 はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。 緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	目	充血、かゆみ、はれ、痛み

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 目のかすみ改善されない場合。
- (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

(裏面につづく)

【効能・効果】

目の疲れ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

【用法・用量】

1回1～3滴、1日3～6回点眼してください。

容器の先端が目につれないように注意すること



<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないこと。また、混濁したものは使用しないこと。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。(レンズに薬剤が徐々に吸着されて、目に刺激を与えたり、レンズの物性に影響を与えることがある。)
- (4) 点眼用のみ使用すること。

【成分・分量】

成分	含量	成分	含量
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005%	ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	0.02%
シアノコバラミン(ビタミンB12)	0.005%	タウリン	1%
フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム(活性型ビタミンB2)	0.04%	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.2%

添加物として塩化Na、ホウ酸、ホウ砂、*l*-メントール、パラベンを含有します。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。特に車のダッシュボード等、高温下に放置したものは、容器の変形や薬液の品質が劣化するおそれがあります。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 本品は、日光あるいは蛍光灯によって退色しやすいので、使用後は、キャップをしっかりしめて、添付の携帯袋に入れ保管すること。
- (4) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (5) 他の人と共用しないこと。(目の病気にかかっている人が使用している目薬を他人が使用した場合、その目薬をとおして感染することがある。)
- (6) 使用期限を過ぎた製品は、使用しないこと。また、使用期限内であっても、開栓後は、用法・用量を守り、できるだけ速やかに使用すること。
- (7) 本剤は、だいたい黄色の目薬であるため、衣服等につかないように注意すること。
(衣服をあやまって薬液で汚した場合には、直ちに水洗いしてください。薬剤の色は衣服についた場合、多少落ちにくいと思われる。あらかじめご注意ください。)
- (8) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合は、清潔なガーゼなどで軽くふきとって使用すること。



直射日光

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれる等、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 電話：03(3370)7174(代表)
受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

発売元

日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元

牛津製薬株式会社
佐賀県小城市牛津町下砥川1-2