

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



## 〈鎮痒消炎薬〉

第2類医薬品

# アセモヒフル

アセモヒフルは赤ちゃんから大人までご使用いただける、患部に優しい非ステロイド性の軟膏です。ジフェンヒドラミンとリドカインのはたらきでかゆみを抑えます。さらに、患部を乾燥させ炎症を抑える酸化亜鉛、患部の炎症を抑えるグリチルレチン酸を配合しています。血行促進作用のあるトコフェロール酢酸エステルが炎症の改善を助け、アラントインが傷の治りを助けます。殺菌作用のあるイソプロピルメチルフェノール配合で、雑菌の繁殖を抑えます。

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### 効能・効果

あせも、かぶれ、ただれ、湿疹、皮膚炎、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

#### 用法・用量


1日数回、適量を患部に塗布又は塗擦してください。

裏面もお読みください。


## 用法・用量に関連する注意

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。

●チューブの折り(尾)の部分から先端に向けて順に押し出してください。(①→②)



●チューブが破れて薬剤がとび出るおそれがあります。折り曲げないでください。 折りたたまないでください。



## 成分・分量 100g中

成分	分量	はたらき
ジフェンヒドラミン	1.0g	抗ヒスタミン作用により、かゆみや炎症をしずめます。
リドカイン	1.0g	局所麻酔作用により、かゆみを和らげます。
酸化亜鉛	20.0g	患部を乾燥させ、炎症をしずめます。
グリチルレチン酸	0.2g	患部の炎症をしずめます。
トコフェロール酢酸エステル	1.0g	血行促進作用により、炎症の改善を助けます。
アラントイン	0.5g	傷の治りを助け、組織を修復します。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用により、雑菌の繁殖を抑えます。
ハッカ油	0.5g	清涼感を与えかゆみを和らげます。

添加物：ゴマ油、ゲル化炭化水素、プロピレングリコール、無水ケイ酸、ポリソルベート80、クエン酸、トウモロコシデンプン

## 保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

本品についてのお問い合わせは  
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。  
万協製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00~17:00  
(ただし、土、日、祝祭日は除きます。)

発売元  
 日邦薬品工業株式会社  
東京都渋谷区代々木3-46-16  
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>  
製造販売元

 万協製薬株式会社  
三重県多気郡多気町五桂1169-142