

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) ステッチバック開封後は、すみやかに服用してください。

第②類医薬品

トローチ
24粒

キキョウ



セネガ



マオウ



和漢薬エキス(マオウ・キキョウ・セネガ)配合

せき・こえ・のど

発売元

アスゲン製薬株式会社

岐阜県瑞浪市山田町字小洞2008 製造番号

製造販売元

高市製薬株式会社

奈良県高市郡明日香村野口10

使用期限

お問い合わせ先 アスゲン製薬(株)
☎ 0572-68-1865

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 0120-140-891

販売名:アベシデリンE 第②類医薬品

服用に際しては、この箱の説明文書を必ず読んでください。

⚠ 使用上の注意

ⓧ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しない

てください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

ⓧ

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 次の症状のある人: 高熱 (6) 次の診断を受けた人: 心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

3. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

せき、咽喉(ぜーぜー、ひゅーひゅー)をともなうせき、たん、のどの炎症による声がれ、のどのあれ、のどの不快感、のどの痛み、のどのはれ

【用法・用量】

次の1回量を1日3~4回、口中に含み、かまずにゆっくりに溶かして服用してください。

年齢	1回量	5歳以上 及び8歳以上	8歳未満	5歳未満
大人(15歳以上)	1粒ずつ2粒まで	1粒	1粒	服用しないこと

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を遵守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】8粒(大人1日量)中

マオウエキス	340mg (原生薬換算量 2,040mg)	気管支をひろげ、せきを鎮めます。 また、のどの炎症をやわらげます。
キキョウ流エキス	400mg	気道粘液の分泌を促進した、 んを出しやすくなります。
セネガ流エキス	200mg	

※ 本剤は和漢薬エキスを用いた製品です。成分により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

鎮咳去痰薬