

ビタミンB1主薬製剤

服用前に説明書きを必ずお読み下さい。

△【使用上の注意】



相談すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】

○次の諸症状の緩和・神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
○脚気「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。」
○次の場合のビタミンB1の補給：肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【保管及び取扱い上の注意】

1.直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。2.小児の手の届かない所に保管して下さい。3.他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）4.使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。5.生薬エキスを配合しているため、沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってお飲み下さい。6.加温・冷凍はさけて下さい。

本剤をご使用になられて、何かお気付きの点がございましたら、下記製造販売元までご連絡頂きますようお願い致します

発売元 **日邦薬品工業株式会社**
東京都渋谷区代々木3丁目46番16号
企画開発 **米田薬品工業株式会社**
製造販売元 **大和合同製薬株式会社**
奈良県橿原市川西町632-1
お問い合わせ先 ☎0744-27-3325
AM9:00～PM5:00（土・日・祝日を除く。）

オキソピタンDX内服液ゴールド

【成分・分量】1瓶(50mL)中
加工大蒜(にんにく抽出成分)..... 100mg
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム... 90mg
チアミン硝酸化物(ビタミンB1) 10mg
リボフラビン(ビタミンB2) 1mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) 25mg
酢酸d-α-トコフェロール(ビタミンE) ... 50mg
ニコチン酸アミド 30mg
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム... 200mg
添加物：ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、クエン酸、DL-リンゴ酸、安息香酸Na、ブチルパラベン、プロピレングリコール、エタノール、香料、その他1成分(アルコール0.25mL以下)
●本剤に配合されているリボフラビンにより尿が黄色になることがあります。

【用法・用量】

成人(15歳以上)1回1瓶(50mL)を1日2回朝夕服用して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量をお守り下さい。
- (2)他のビタミン等を含有する製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意して下さい。
- (3)15歳未満は服用しないで下さい。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

ガラス:瓶 金属:キャップ

使用期限 製造番号

眼精疲労 肩こり 腰痛

オキソピタンDX 内服液ゴールド

OXOPITAN DX LIQUID GOLD

第3類医薬品



- にんにく抽出成分 ● ビタミンB1・B2・E
- コンドロイチン ● ニコチン酸アミド
- L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム