

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

総合感冒薬

牛黄・桔梗・甘草配合

シンピタ®Eース

本剤は、古くからかぜ薬として重宝されてきた漢方生薬のゴオウ（牛黄）、地竜、桔梗、甘草に西洋薬を配合した総合感冒薬のカプセルです。

かぜは万病のもとと言われますが、薬を服用するだけでなく、出来るだけ早期に保温や安静に留意して、正しい治療をお願い致します。

## ⚠️【使用上の注意】

### ⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

- 次の人は服用しないで下さい
  - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい  
（眠気等があらわれることがあります。）
- 服用前後は飲酒しないで下さい
- 長期連用しないで下さい



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
  - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 授乳中の人。
  - 水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15歳未満）。
  - 高齢者。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
  - 次の診断を受けた人。  
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
薬剤性過敏症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節（首、わきの下、股の付け根等）のはれ等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

（裏面もお読み下さい）

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

### 【効能・効果】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和


### 【用法・用量】

次の量を食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	2カプセル	3回
7歳以上15歳未満	1カプセル	
7歳未満	服用しないで下さい	

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守して下さい。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- カプセルの取り出し方  
右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



### 【成分・分量】

6カプセル（大人の1日量）中

成 分	含 量	作 用
ゴオウ（牛黄）	10mg	熱を下げる効果のある生薬です。
ジリュウ乾燥エキス （原生薬として）	52mg 400mg	
キキョウ乾燥エキス （原生薬として）	54mg 540mg	せきを鎮め、たんを除き、のどの痛みをやわらげます。
カンゾウ乾燥エキス （原生薬として）	134mg 670mg	せきを鎮め、たんを除き、筋肉や関節の痛みをやわらげます。
アセトアミノフェン	540mg	熱を下げ、痛みをやわらげます。
エテンザミド	400mg	
無水カフェイン	90mg	解熱・鎮痛成分の働きを助けます。
クエン酸チペピジン	48mg	せきを鎮めます。
dl-メチルエフエドリン塩酸塩	40mg	気管支をひろげ、呼吸しやすくします。
ヘスペリジン	30mg	ビタミン類
クロルフェニランマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりを抑えます。

添加物：部分アルファー化デンプン、トウモロコシデンプン、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ラウリル硫酸Na、ゼラチン

### 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

（お問い合わせ先）

伸和製薬株式会社 情報管理室

電 話：03-3807-3780

受付時間：9時～17時（土・日曜、祝日を除く）

販 売 元 **日邦薬品工業株式会社**  
東京都渋谷区代々木3丁目46番16号  
<https://www.nippo-yakuhin.jp/>



発 売 元 **伸和製薬株式会社**  
東京都荒川区南千住5丁目17番8号



製造販売元 **佐藤薬品工業株式会社**  
奈良県橿原市観音寺町9番地の2