

のんで効く 皮膚炎、皮膚のかゆみ、鼻炎のくすり

第2類医薬品

# タウロミン<sup>®</sup> 顆粒 500g

皮膚疾患の1/3は湿疹・皮膚炎といわれ、近年鼻炎とともにこれらアレルギー症状をあらわす人が増加する傾向にあります。これには、最近の衣・食・住等生活環境の変化に加え、季節・気候等外的因子、体内の変調、栄養状態、ホルモン分泌等内的因子などが深く関係しているといわれます。

タウロミン顆粒は、これらの原因による皮膚の炎症や鼻炎に有効な和漢生薬に、カルシウム、ビタミン、アミノ酸などの栄養成分を配合した、皮膚疾患・鼻炎のための内服治療剤です。

## ■成分・分量 3.6g(1日量)中

サイコ末・ハマボウフウ末・センキュウ末・ブクリヨウ末・オウヒ末・キキョウ末・ショウキョウ末…各90mg	ビロキシン塩酸塩(ビタミンB6)…………… 3.6mg
ドクカツ末・ケイガイ末・カンゾウ末…………… 各54mg	ニコチン酸アミド…………… 14.4mg
リン酸水素カルシウム水和物…………… 1,080mg	パントテン酸カルシウム…………… 14.4mg
乳酸カルシウム水和物…………… 360mg	イノシトール…………… 18mg
ヨクイニン末…………… 360mg	エルゴカルシフェロール(ビタミンD <sub>2</sub> )…………… 9μg(360I.U.)
タウリン…………… 360mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩…………… 3.6mg
グルクロノラクトン…………… 180mg	ラクトサン末…………… 180mg
チアミン硝化物(ビタミンB <sub>1</sub> )…………… 7.2mg	
リボフラビン(ビタミンB <sub>2</sub> )…………… 7.2mg	

添加物：デキストリン、カルメロースCa、乳糖、ステアリン酸Mg

## ■用法・用量

年齢	成人(15才以上)	8才以上15才未満	5才以上8才未満	3才以上5才未満	1才以上3才未満
1回量	1.2g(1匙)	0.6g(1/2匙)	0.4g(1/3匙)	0.3g(1/4匙)	0.2g(1/6匙)

1日3回服用してください。(添付の匙をご使用ください)

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## ■効能・効果

湿疹、皮膚炎、じんま疹、皮膚のかゆみ、鼻炎

## ■保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
4. 本剤をぬれた手で扱わないでください。(変色したり品質が変わることがあります。)
5. 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

※本剤は和漢生薬を配合していますのでときに顆粒の色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

※本剤の服用により尿が黄色くなるがありますが、リボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>)によるものですから、心配ありません。

製造番号：

使用期限：

## ⚠ 使用上の注意

**❌ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと  
他のアレルギー用薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬等)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと (眠気等があらわれることがある)
3. 長期運用しないこと

**👤 相談すること** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 次の症状のある人。 排尿困難(5) 次の診断を受けた人。 線内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること


関係部位	皮膚	消化器	泌尿器
症状	発疹・発赤、かゆみ	吐き気・嘔吐、食欲不振	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること □のがわき、眠気
4. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

本品のお問い合わせは、お求めのお店又は日邦薬品工業株式会社 お客様相談室  
「電話：03-3370-7174(代表)」にお願いいたします。受付時間…9：00～17：00(土、日、祝日を除く)



発売元 日邦薬品工業株式会社  
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元 福井製薬株式会社  
大阪市城東区今福東3-1-26