

第2類医薬品

妊娠・授乳期、発育期、老年期のカルシウム補給に

ハイブリルS[®]

(クロレラ配合)

カルシウムは約99%が骨や歯に存在し、残りは血液中または筋肉に存在します。そして特に骨は発育期から25～30才までに造られてしまいますので若いうちに充分に骨を造り、それ以後は骨からカルシウムを流出しないように補給に注意しなければなりません。

カルシウムの主な働き

- ◎骨格や歯を形成する
- ◎神経の伝達に関与する
- ◎血液の凝固に関与する
- ◎筋肉の収縮に関与する

ハイブリルSの特長

- カルシウム含量が高く吸収のよい沈降炭酸カルシウムを使用
- カルシウムとの相互作用によって、骨や歯を形成するマグネシウムを配合
- カルシウムの吸収を助けるタウリン・ビタミンD₃を配合
- 新陳代謝を高め、健康維持や栄養補給に必要なビタミン(B₂、B₆、E)を配合
- 骨形成に必要なコラーゲンの合成と、骨芽細胞(骨をつくる細胞)の増殖を促進するビタミンCを配合
- 添加物として、クロレラを配合



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
医師の治療を受けている人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
便秘
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

次の場合のカルシウムの補給：妊娠・授乳期、発育期、老年期

用法・用量

次の服用量を1日3回服用してください。

年 齢	成人(15才以上)	11才以上15才未満	5才以上11才未満	5才未満
1回量	3錠	2錠	1錠	服用しないこと

(用法・用量に関する注意)

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

9錠(1日量)中に次の成分・分量を含んでいます。

成 分	分 量 (9錠中)
沈降炭酸カルシウム	1375mg (Caとして550mg)
炭酸マグネシウム	118.4mg (Mgとして30mg)
タウリン	200mg
リボフラビン(V.B ₂)	10mg
ピリドキシン塩酸塩(V.B ₆)	10mg
アスコルビン酸(V.C)	100mg
コレカルシフェロール(V.D ₃)	200I.U.
コハク酸d- α -トコフェロール(V.E)	25mg

添加物：クロレラ、エチルセルロース、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノラウリン酸ソルビタン、ゼラチン、白糖、セルロース、CMC-Ca、ステアリン酸Mg
・本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビン(ビタミンB₂)によるものですから、心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は服用しないでください。

本品のお問い合わせは、お求めのお店、又は日邦薬品工業株式会社 お客様相談室
「電話：03-3370-7174 (代表)」をお願いいたします。
受付時間……………9:00～17:00(土、日、祝日を除く)