

この説明文書は服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように保管してください。

第2類医薬品

水なしで服用できるチュアブルタイプのカルシウム剤

ブリアル®Ca・D₃

ビタミンD₃配合

カルシウムは約99%が骨や歯に存在し、残りは血液中または筋肉に存在します。そして特に骨は発育期から25～30才までに造られてしまいますので若いうちに十分に骨を造り、それ以後は骨からカルシウムを流出しないように補給に注意しなければなりません。

カルシウムの主な働き

- ◎ 骨格や歯を形成する
- ◎ 神経の伝達に関与する
- ◎ 血液の凝固に関与する
- ◎ 筋肉の収縮に関与する

カルシウムが不足すると骨や歯に悪影響を及ぼすばかりでなく、血液、神経、細胞、代謝などにいろいろな障害をきたします。ストレスが高まったり、イライラが高じたり、体がだるい、眠れない、食欲がないなどはカルシウムが不足しているときによく感じられる自覚症状ということになります。カルシウムは、このように体の中で非常に重要な働きをしているのです。

ブリアル®Ca・D₃の特長

- 水なしで服用できるチュアブルタイプのカルシウム剤です。
- 1日1錠で550mgのカルシウムが摂れます。
- お子さまからお年寄りの方までカルシウムの補給に適しています。
- ビタミンD₃の配合によりカルシウムの吸収を促進いたします。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
医師の治療を受けている人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
便秘
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

次の場合のカルシウム補給：妊娠・授乳期、発育期、老年期

用法・用量

次の服用量を1日1回服用してください。

年 齢	成人(15才以上)	7才以上15才未満	7才未満
1 回 量	1錠	1／2錠	服用しないこと

(用法・用量に関する注意)

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 本剤は必ず口の中で溶かすか、かみくだいて服用してください。

成分・分量

1錠(1日量)中に次の成分・分量を含んでいます。

成 分	分 量(1錠中)
沈降炭酸カルシウム	1375mg (Caとして550mg)
タウリン	50mg
コレカルシフェロール(ビタミンD ₃)	200IU

添加物：D-ソルビトール、キシリトール、ヒドロキシプロピルセルロース、クエン酸、ステアリン酸Mg、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノラウリン酸ソルビタン、ゼラチン、白糖、香料、アラビアゴム、プロピレングリコール、グリセリン脂肪酸エステル、メタリン酸Na、乳糖、デキストリン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 本品は湿気などの影響で変質することがありますので、服用後はフタをしっかりと締めてください。
- (5) ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するのために入れてあるもので、キャップ開封後は捨ててください。
- (6) 使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は服用しないでください。

本品のお問い合わせは、お求めのお店又は日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

「電話：03-3370-7174(代表)」にお願いいたします。

受付時間・・・9：00～17：00(土、日、祝日を除く)

発売元



日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元



福井製薬株式会社
大阪府城東区今福東3丁目1番26号