

開封口

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。
ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

【販売名】 ラウマーV9水虫液
(みずむし・たむし用薬)

【成分・分量】 (100g中)
ブテナфин塩酸塩1.0g、イソプロピルメチルエノール0.3g、クロルフェニラミンマレイン酸塩0.5g、クロタミントン5.0g、リドカイン2.0g、アラントイン0.1g、グリチルレチン酸0.5g、dl-カンフル1.0g、l-メントール1.0g
添加物：1,3-ブチレンギリコール、マクロゴール、リン酸、エタノール
(成分に関する注意)
アルコールを含んでいますので、塗布時にしみことがあります。

【効能・効果】
みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】
1日1回、適量を患部に塗布してください。
(用法・用量に関する注意)
(1)定められた用法・用量を厳守してください。
(2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
(4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(5)外用にのみ使用してください。
(容器の使用法)
● 使用前に、容器の先端を上に向けて、手の指で中栓の先を2~3回空押しして中の空気を抜いてください。(暑い時期、高温の場所に置かれた場合や薬液が少なくなった場合などに、容器内の圧力が高まり薬液が多く出ることがありますので、これを防ぐためです。)
● 使用するときは容器を下向き又は斜めにして、先端を患部に軽く押し当てて塗布してください。容器の先端を患部から離すと液が出なくなります。(強く押し当てる、容器底部を強く握ると薬液が多く出ます。)

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください。
(1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、喉等)、陰のう、外陰部等。
(2)湿疹。
(3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

▣ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
(3)乳幼児。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)患部が顔面又は広範囲の人。
(6)患部が化膿している人。
(7)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはつきりしない人。
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位 **症 状**

皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、落屑、ただれ、水泡、乾燥感、ヒリヒリ感、亀裂
-----	--

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。
- 火気近くでないでください。
また、使用済みの容器は火中に投じないでください。
- 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- 合成樹脂(スチロール等)を軟化したり、塗料を溶かしたりすることができますので、床や家具等につかないようにしてください。

目には入れないこと

火気厳禁
第二石油類 水溶性 危険等級Ⅲ
(エタノール)

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

発 売 元
日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3丁目46番16号
<https://www.nippo-yakuhiin.jp/>

製造販売元
万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

万協製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00~17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます。)

日本製
容量 : 30mL