

ここからお開きください

ラホマ20DX

第3類医薬品

【無香料・無着色】

皮膚軟化治療薬

効能・効果

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌


用法・用量

1日数回適量を患部に塗擦してください

(用法及び用量に関する注意)

(1) 定められた用法・用量を守ってください。(2) 小児(15歳未満)には使用させないでください。(3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるお湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診察を受けてください。(4) 外用にのみ使用してください。(5) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。(6) 化粧品ではないので、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。

使用期限
製造番号



万協製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00~17:00

(ただし、土、日、祝日は除きます。)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

発売元 日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

http://www.nippo-yakuhin.jp/

製造販売元 万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五柱1169-142

このような症状に

コチコチ
かかるとに



手指の
あれに



成分・分量 (100g中)

尿素 20.0g、トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) 0.5g、グリチルリチン酸-アンモニウム 0.5g、パンテノール 1.0g
添加物：ミリスチン酸イソプロピル、ステアリン酸、ステアリルアルコール、モノステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、ジメチルポリシロキサン、ジプロピレングリコール、D-ソルビトール、パラベン、エデト酸Na、グリシン、BHT、カルボキシビニルポリマー、ジソプロパノールアミン、乳酸

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封したあとはなるべく早く使用してください。



コチコチのかかと 手指のあれ 乾燥肌の治療薬

ラホマ20DX

第3類医薬品 90g

尿素
20%
保湿成分

パンテノール
組織修復
促進成分

ビタミンE
血行促進
成分

グリチルリチン酸
-アンモニウム
抗炎症成分

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の記載内容をよくお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 次の部位には使用しないでください。

- (1) 顔面、目の周囲、粘膜(例えば口腔、鼻腔、膈等)等。
- (2) 引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位。
- (3) かさぶたの様に皮膚がはがれているところ。
- (4) 炎症部位(ただれ、赤く腫れているところ)。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、かぶれ、刺激感(痛み、熱感、びりびり感)、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。