

## △使用上の注意



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

#### 3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 【効能・効果】

○滋養強壮○虚弱体質○肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

### 【用法・用量】

大人(15才以上) 1日1回1ビン(100mL)を服用してください。  
<用法・用量に関連する注意>用法・用量を厳守すること。

### 【成分・分量】

1ビン(100mL)中、次の成分を含有します。パンリパーエキス・100mg/コンドロイチン硫酸エステルナトリウム・50mg/タウリン・1,000mg/リボフラビンリン酸エステルナトリウム(V.B<sub>2</sub>)・5mg/ピリドキシン塩酸塩(V.B<sub>6</sub>)・10mg/ニコチン酸アミド・20mg/無水カフェイン・50mg/(アルコール0.5mL以下)/添加物として白糖、水アメ、D-ソルビトール、dl-リンゴ酸、クエン酸水和物、酒石酸、コハク酸、安息香酸Na、パラベン、エタノール、香料を含有します。



# レバコール®

## LEVERCOL 100

### 第3類医薬品

# 100mL

<成分・分量に関連する注意>(1)本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB<sub>2</sub>)により、尿が黄色になることがありますがお心配ありません。(2)天然物を使用していますので、まれに沈殿を生じることがありますが薬効には影響ありません。よく振ってから服用してください。

### 【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-9311

使用期限

製造番号

発売元 **日邦薬品工業株式会社**

東京都渋谷区代々木3-46-16

お問い合わせ先：03(3370)7174

製造販売元 **牛津製薬株式会社**

佐賀県小城市牛津町下砥川1-2