

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

外用痔疾用薬

レーバンG軟膏

第2類医薬品

- ◆痔は肛門やその周辺に発生する病気の総称です。肛門は静脈が網の目のように集まっています。二本の足で上半身を支える人間は、ただでさえ肛門にうっ血が起こりやすいのですが、排便などで腹圧がかかるとさらにうっ血が起こり、これが痔の原因となります。痔はそのままにしておくとも慢性化して治りにくくなるので、日頃の養生と早めの手当てが大切です。
- ◆**レーバンG軟膏**は、痔の痛み、はれ、かゆみを緩和する成分を効果的に配合した、色のつかない軟膏です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感

3. 10日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

内痔核・外痔核・裂肛・脱肛・肛門湿疹・肛門掻痒・肛門潰瘍

用法・用量

1日1～2回、適宜量をそのまま塗布するか、ガーゼにのぼして貼布してください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 肛門部にのみ使用してください。

裏面もお読みください。

成分・分量

(100 g 中)

成分	含量	はたらき
次硝酸ビスマス	10.0 g	出血を止め、患部を保護します。
アミノ安息香酸エチル	5.0 g	痔の痛み、かゆみを鎮めます。
ナファゾリン塩酸塩	0.02 g	充血やはれを抑え、痔の不快感をとります。
オキソアミジン	0.5 g	創面を治します。
ヨークレシチン	0.5 g	局所に栄養を与え、傷の治りを早くします。
グリチルレチン酸	0.4 g	局所のかゆみを鎮めます。
トコフェロール酢酸エステル	0.5 g	充血やはれを抑え、痔の不快感をとります。
龍腦	1.5 g	患部の熱をとり、はれを鎮めます。



添加物として、マクロゴールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替ええないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、一度開封した後は使用期限内であってもなるべく早く使用してください。

●チューブの折り(尾)の部分から先端に向けて順に押し出して
ください。(①→②)

●チューブが破れて薬剤がとび出るおそれがあります。



折り曲げないでください。

折りたたまないでください。

治療のポイント

- 排便後は**レーバングローション**で清拭して、肛門を常に清潔にしましょう。
- 入浴は患部の血行を改善するので、毎日入るよう心がけましょう。
- 便秘や下痢をしないよう心がけましょう。特に便秘の時には、煮た野菜や海藻類・果物等を多く食べ、便通をととのえましょう。
- アルコール類・刺激物(からし、わさび等)を多くとると、症状を悪化させることがあるので、なるべくひかえましょう。
- すわり続ける等、同じ姿勢で長くいると、肛門部がうっ血するため、症状を悪化させやすいので、時々体操や散歩等をして、体を動かしましょう。

本品についてのお問い合わせは
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

万協製薬株式会社「お客様相談室」

電話 **0598-30-5376**

受付時間 10:00~17:00

(ただし、土、日、祝祭日は除きます。)



発売元

日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

<http://www.nippo-yakuhin.jp/>

製造販売元



万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142