

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

〈外用痔疾用薬〉
痔の痛み・出血・はれ・かゆみに

レーバンH

第2類医薬品

- ◆レーバンHは痔の初期の代表的な4つの症状となっている痛み、出血、はれ、かゆみを緩和する目的でそれらの症状に適切な有効成分を選んで処方した白色の軟膏です。
- ◆痔はそのままにしておくと慢性化して治りにくくなってしまいます。痔はひとりで苦しまず恥かしがらず早めの適切な手当てが大切です。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

1. 次の人は使用しないでください
患部が化膿している人。
2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|--------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |
| その他 | 刺激感、化膿 |

3. 10日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

痔による痛み・出血・はれ・かゆみ

用法・用量

1日1～3回適宜量を患部に塗布するか、またはガーゼにのぼして貼付してください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 肛門部のみ使用してください。

裏面もお読みください。

成分・分量

(100 g 中)

| 成分 | 含量 | はたらき |
|----------------------|--------|----------------------|
| ヒドロコルチゾン酢酸エステル | 0.25 g | 患部のはれ、かゆみをしずめます。 |
| リドカイン | 3.00 g | 患部の痛み、かゆみをしずめます。 |
| クロルヘキシジン塩酸塩 | 0.20 g | 患部を細菌の感染からまもります。 |
| グリチルレチン酸 | 0.40 g | 患部の炎症、かゆみをおさえます。 |
| アラントインクロルヒドロキシアルミニウム | 0.30 g | 血管を収縮させ、止血効果をあらわします。 |

添加物として d-ボルネオール、マクロゴールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。

●チューブの折り(尾)の部分から先端に向けて順に押し出してください。(①→②)

●チューブが破れて薬剤がとび出るおそれがあります。



折り曲げないでください。

折りたたまないでください。

治療のポイント

- 排便後は**レバングローション**で清拭して、肛門を常に清潔にしましょう。
- 入浴は患部の血行を改善するので、毎日入るよう心がけましょう。
- 便秘や下痢をしないよう心がけましょう。特に便秘の時には、煮た野菜や海藻類・果物等を多く食べ、便通をととのえましょう。
- アルコール類・刺激物(からし、わさび等)を多くとると、症状を悪化させることがあるので、なるべくひかえましょう。
- すわり続ける等、同じ姿勢で長くいると、肛門部がうっ血するため、症状を悪化させやすいので、時々体操や散歩等をして、体を動かしましょう。

本品についてのお問い合わせは
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

万協製薬株式会社

電話 0598-37-2088

受付時間 AM 10:00~PM5:00

(ただし、土、日、祝祭日を除きます。)



発売元

日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

<http://www.nippo-yakuhin.jp/>

製造販売元



万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142